

Odporúčané očkovanie nad rámec nariadených očkovaní, na žiadosť rodiča

V prípade záujmu o vakcináciu nad rámec povinného očkovania kontaktujte našu ambulanciu.

Dieťa by malo byť zdravé, s dostatočným odstupom od predchádzajúceho ochorenia.

So sestričkou si dohodnete termín na zaočkovanie dieťaťa

a bude Vám vystavený recept, na základe ktorého zakúpite konkrétnu vakcínu v lekárni.

Výkon očkovania na žiadosť, s výnimkou očkovania proti chrípke, nie je hradený zdravotnou poisťovňou, uhrádza ho rodič podľa aktuálne platného cenníka ambulancie.

Po každom očkovaní

je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára.

Kliešťová encefalitída

- vírus kliešťovej encefalitídy **prenášajú na človeka infikované rôzne vývojové štádiá kliešťov**, kliešte sa nakazia pri prisatí na rezervoárové zvieratá /líšky, hlodavce, vysokú zver, aj domáce voľne sa pasúce zvieratá ovce a kozy/, **prenos nákazy je možný aj požitím vírusu v mlieku nakazených zvierat** - pozor na kozie mlieko a nekontrolované produkty z ovčieho mlieka

- inkubačná doba ochorenia je 7-14 dní, ochorenie má typický dvojfázový priebeh

- základné očkovanie sú **3 dávky vakcíny** podané do svalu, vo vakcíne sa nachádza usmrtený vírus, najvhodnejšie je **začať** s očkovaním **v zimných mesiacoch**, očkovanie sa má **obnovovať v intervale 3-5 rokov**, aby bola hladina protilátok dostatočne ochranná, očkovať možno od ukončeného 12.mes. veku – do ukončeného 15.roka sa podáva detská vakcína, očkovanie **nechráni proti borelióze**.

- vedľajšie, **nežiaduce účinky očkovania**

- reakcie v mieste vpichu – začervenanie, opuch, bolesť, zdurení lymfatických uzlín
- celkové príznaky podobné chrípke- teplota, bolesti hlavy, svalov, parestézie, nauzea, vracanie, bolesti kĺbov a v oblasti šije
- ojedinele potenie, triaška, bolesti kĺbov, svalov, alergická reakcia, prechodná trombocytopenia, resp. poruchy centrálného a periférneho nervového systému

- očkovanie a vakcínu hradí rodič