

### **Odporúčané očkovanie nad rámec nariadených očkovaní, na žiadosť rodiča**

V prípade záujmu o vakcináciu nad rámec povinného očkovania kontaktujte našu ambulanciu.

Dieťa by malo byť zdravé, s dostatočným odstupom od predchádzajúceho ochorenia.

So sestričkou si dohodnete termín na zaočkovanie dieťaťa

a bude Vám vystavený recept, na základe ktorého zakúpite konkrétnu vakcínu v lekárni.

Výkon očkovania na žiadosť, s výnimkou očkovania proti chrípke, nie je hradený zdravotnou poisťovňou, uhrádza ho rodič podľa aktuálne platného cenníka ambulancie.

### **Po každom očkovaní**

**je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára.**

## **Ovčie kiahne-varicella**

- zdrojom nákazy je chorý človek 2 dni pred začatím príznakov do 5 dní po skončení výsevu vyrážok a ich zaschnutí, **inkubačná doba je 9-21 dní**, vírus sa šíri vzduchom, **nákazlivosť je vysoká**, ochorenie prebieha s rôznou intenzitou – od miernych po ťažké príznaky s horúčkou, hustým výsevom, komplikáciami v zmysle zápalu pľúc a zápalu mozgu, druhotnej infekcie vyrážok

- **očkovanie navodí dlhodobú aktívnu ochranu** proti ochoreniu, vo vakcíne je živý, oslabený vírus v kontrolovanom množstve, očkovať **možno deti od ukončeného 12. mesiaca veku** a všetky vnímavé osoby – teda aj dospelých, ak neprekonali ovčie kiahne v detstve – odporúča sa podať 2 dávky vakcíny, s odstupom 4-12 týždňov /najčastejšie 12 týždňov/ aj podanie len 1 dávky malým deťom má význam - ochráni dieťa pred ťažkým priebehom infekcie, nechráni však dlhodobu

- existujú **2 typy** očkovacích látok – **kombinovaná** vakcína varicella a osýpky, rubeola, mumps /aktuálne nie je dostupná/ a **samostatná** vakcína proti varicelle – Varivax – výrobca MSD

- očkuje sa do svalu alebo **podkožnou injekciou** do ramena, resp. prednej strany stehna

- očkovacia látka **sa nesmie podať tehotnej žene**, a očkovaným ženám **sa odporúča neotehotnieť 3 mesiace po očkovaní**

- **po očkovaní sa nesmie počas 6 týždňov užívať Acylpyrin, resp. iné salicyláty !!!**

- vedľajšie, **nežiaduce reakcie po očkovaní**

- zdurenie lymfatických uzlín, pokles krvných doštičiek, nechutenstvo, podráždenosť, plač, poruchy spánku, bolesť hlavy, ospalosť, katar horných dýchacích ciest, zápal spojiviek, kožná vyrážka – podobná kiahňam alebo iná, teplota, bolesť svalov a kĺbov, opuch a začervenanie v mieste podania, ojedinele alergická reakcia

- očkovaciu látku a očkovanie neuhrádzajú zdravotné poisťovne, hradí v plnej miere rodič